



V Praze dne 5. 3. 2021

Tisková zpráva

SVS kvůli rhinopneumonii koní zpřísňuje podmínky pro svody koní

V posledních dnech Státní veterinární správa (SVS) odpovídá řadu dotazů ohledně onemocnění rhinopneumonie koní (RPK) vyvolané herpesvirem EHV-1. Kvůli šíření virulentního kmene viru například [zrušila](#) Mezinárodní jezdecká federace konání jezdeckých akcí v deseti evropských zemích. SVS tato preventivní opatření jezdeckých organizací podporuje. V reakci na situaci upravuje podmínky pro svody koní o povinnost platné vakcinace proti této nákaze. Zároveň apeluje na chovatele, aby koně pravidelně vakcinovali a věnovali maximální pozornost biologické bezpečnosti v chovech.

Koňský herpesvirus 1 (EHV-1) je patogen způsobující respiratorní, reprodukční, ale i nervové onemocnění koní. Pro herpesviry je charakteristická latentní infekce, to znamená, že jednou nakažené zvíře, zůstává infikováno celý život. Virus může migrovat do nervových ganglií a tam se ukrýt před imunitním systémem. Poté může dojít i k vymizení protilátek. Proto jednorázové vyšetření na protilátky nelze považovat za prokazatelné. Navíc nelze odlišit postvakcinační a postinfekční protilátky a proto u vakcinovaných zvířat není možné provádět v rámci monitoringu sérologické vyšetření na průkaz protilátek. Nejeefektivnější způsob prevence této nákazy je vakcinace. Koně je třeba udržovat v imunitě opakovanou vakcinací dle doporučení v příbalovém letáku.

„Legislativa u RPK nestanovuje povinnou vakcinaci koní, nicméně SVS ji z preventivních důvodů dlouhodobě rozhodně doporučuje,“ uvedl **ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád**.

Z pohledu veterinárního dozoru se nejedná o tzv. nákazu povinnou hlášením, kde existuje povinnost podezření na tuto nákazu hlásit a vyšetřovat. Pokud však koně vykazují nervové příznaky, mohlo by se jednat i o jinou nákazu – tzv. západonilskou horečku. V případě nervových příznaků je nutné kontaktovat veterinárního lékaře, případně tuto skutečnost nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

„V reakci na situaci budou nově podmínky svodu umožňovat pouze účast koní, kteří jsou v imunitě proti této nákaze, tj. byli vakcinováni proti herpesviru koní v souladu s doporučením výrobce konkrétní použité vakcíny,“ řekl **Semerád**.

Kromě pravidelné vakcinace je zásadní také dodržování správné chovatelské praxe a biologické bezpečnosti v chovech, a to zejména při přemísťování koní či nákupu nových jedinců do stáje. Jedná se především o zajištění karantény nově příchozích koní a požadavek na přesun koní v postvakcinační imunitě.

„Nákazovou situaci nadále bedlivě sledujeme. V případě, že by došlo k jejímu významnému zhoršení, jsme připraveni přijmout další opatření proti šíření nákazy,“ uzavřel **Semerád**.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS